


Analitička geometrija ravnine – osnovne formule

Udaljenost između dvije točke $T_1(x_1, y_1)$ i $T_2(x_2, y_2)$:

$$d(T_1, T_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Dijeljenje dužine $\overline{T_1T_2}$ točkom $T(x_t, y_t)$ u omjeru

$$-\lambda = \frac{|T_1T|}{|TT_2|} : \quad x_t = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} \quad y_t = \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}$$



Pravac u koordinatnom sustavu

Eksplicitna jednadžba pravca:

$$y = k \cdot x + l$$

pravac je $\begin{cases} \text{rastući} & \text{ako je } k > 0 \\ \text{padajući} & \text{ako je } k < 0 \\ \text{vodoravan} & \text{ako je } k = 0 \end{cases}$

Implicitna jednadžba pravca:


$$A \cdot x + B \cdot y + C = 0$$

Segmentna jednadžba pravca; ako pravac na osima O_x i O_y

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$$

Pravac zadan s točkom $T(x_1, y_1)$ i **koeficijentom smjera** k

$$y - y_1 = k \cdot (x - x_1)$$



Pravac zadan s dvije točke $T_1(x_1, y_1)$ i $T_2(x_2, y_2)$:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Udaljenost δ **točke** do **pravca**; točka $T(x_0, y_0)$ i pravac $Ax+By+C=0$:

$$\delta = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$$

Kut φ **između pravca** $y = kx + l$ i **osi** O_x :


$$\operatorname{tg} \varphi = k$$

Kut φ **između dva pravca** s koeficijentima smjera k_1 i k_2 :

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \quad (\text{ako dobijemo } \varphi > 90^\circ \text{ tada kao rezultat uzimamo } 180^\circ - \varphi)$$

Uvjet paralelnosti i okomitosti dvaju pravaca s koeficijentima smjera k_1 i k_2 :

pravci p_1 i p_2 su $\begin{cases} \text{paralelni } p_1 \parallel p_2, & \text{ako je } k_1 = k_2 \\ \text{okomiti } p_1 \perp p_2, & \text{ako je } k_1 = -\frac{1}{k_2} \end{cases}$



Kružnica

Jednadžba kružnice sa središtem $S(p, q)$ i polumjerom r :

$$(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$$

Jednadžba centralne kružnice:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Jednadžba tangente na kružnicu s diralištem $D(x_0, y_0)$:

$$(x - p)(x_0 - p) + (y - q)(y_0 - q) = r^2$$

Uvjet da bi pravac $y = kx + l$ **bio tangentna na kružnicu:**

$$r^2 \cdot (k^2 + 1) = (k \cdot p - q + l)^2$$

Elipsa

Svojstvo proizvoljne točke T na elipsi:

$$d(T, F_1) + d(T, F_2) = 2 \cdot a = \text{const}$$


Jednadžba elipse ($a > b$):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad b^2 \cdot x^2 + a^2 \cdot y^2 = a^2 \cdot b^2$$

Jednadžba tangente na elipsu s diralištem $D(x_0, y_0)$:

$$\frac{x \cdot x_0}{a^2} + \frac{y \cdot y_0}{b^2} = 1$$

Uvjet da bi pravac $y = kx + l$ bio tangentna na elipsu:



$$a^2 k^2 + b^2 = l^2$$

Linearni ekscentricitet: $e = \sqrt{a^2 - b^2}$

Numerički ekscentricitet: $\varepsilon = \frac{e}{a}$

Hiperbola

Svojstvo proizvoljne točke T na hiperboli:

$$|d(T, F_1) - d(T, F_2)| = 2 \cdot a = \text{const}$$

Jednadžba hiperbole:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad b^2 \cdot x^2 - a^2 \cdot y^2 = a^2 \cdot b^2$$


Jednadžba tangente na hiperbolu s diralištem $D(x_0, y_0)$:

$$\frac{x \cdot x_0}{a^2} - \frac{y \cdot y_0}{b^2} = 1$$

Asimptote na hiperbolu:

$$p_1 \dots y = -\frac{b}{a} \cdot x \quad p_2 \dots y = \frac{b}{a} \cdot x$$

Uvjet da bi pravac $y = kx + l$ bio tangentna na hiperbolu:



$$a^2 k^2 - b^2 = l^2$$

Linearni ekscentricitet: $e = \sqrt{a^2 + b^2}$

Numerički ekscentricitet: $\varepsilon = \frac{e}{a}$

Parabola

Svojstvo proizvoljne točke T na paraboli:

$$d(T, F) = d(T, r)$$

Jednadžba parabole:

$$y^2 = 2p \cdot x$$

Jednadžba tangente na parabolu s diralištem $D(x_0, y_0)$:

$$y \cdot y_0 = p \cdot (x + x_0)$$

Jednadžba ravnalice parabole: $r \dots x = -\frac{p}{2}$

Uvjet da bi pravac $y = kx + l$ bio tangentna na parabolu:

